

TEST FISIOTERAPIA

ESAME

Questionario

N.B. OGNI DOMANDA PREVEDE UNA SOLA RISPOSTA ESATTA: SCRIVERE LA LETTERA RELATIVA ALLA RISPOSTA ESATTA SUL FOGLIO RIEPILOGATIVO ALLEGATO

1. Sono microorganismi patogeni responsabili di infezioni frequenti delle vie urinarie nell'anziano tutti tranne:

- a) klebsiella
- b) enterobacter
- c) enterococco
- d) Sthaphylococcus aureus

2. Quale tra i seguenti è un parametro diagnostico di disidratazione in età geriatrica

- a) scarso tugore della cute
- b) lingua secca
- c) riduzione della pressione arteriosa
- d) tutte le precedenti

3. Il metodo attualmente più diffuso per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi nelle strutture sanitarie è:

- a) Il metodo NIOSH
- b) Il metodo MAPO
- c) la misura dinamometrica
- d) la valutazione della pianta organica

4. I germi responsabili di ulcere da pressione infette sono:

- a) cocchi gram-positivi
- b) aerobi gram-negativi
- c) anaerobi
- d) tutti

5. Nell'anziano i T- linfociti sono:

- a) assenti
- b) diminuiti
- c) invariati
- d) aumentati

6. Nel diabete insipido le urine sono:

- a) isotoniche
- b) ipertoniche
- c) cariche d'albumina
- d) ipotoniche

7. **Quando si parla di "carico parziale" la percentuale di carico consentito sull'arto interessato, è pari a circa:**
- a) 70-80% del peso del soggetto
 - b) 50-70% del peso del soggetto
 - c) 20-50% del peso del soggetto
 - d) 10-20% del peso del soggetto
8. **Una frattura a livello del collo anatomico è detta:**
- a) Sottocapitata
 - b) Basicervicale
 - c) Pertrocanterica
 - d) Sottotrocanterica
9. **Quale fra le seguenti fratture presenta il più alto rischio di necrosi della testa femorale?**
- a) Frattura sottocapitata
 - b) Frattura pertrocanterica
 - c) Frattura sottotrocanterica
 - d) Tutte le fratture di femore citate
10. **La paralisi del nervo circonflesso può causare un deficit:**
- a) Del deltoide
 - b) Del sovraspinoso
 - c) Della cuffia dei rotatori
 - d) Del bicipite
11. **In caso di lassità legamentosa, quale può essere un utile strumento terapeutico per migliorare la funzionalità dell'articolazione interessata?**
- a) il pompages
 - b) il rinforzo muscolare
 - c) il massaggio
 - d) la manipolazione
12. **Nella sindrome da impingement sub-acromiale, viene compresso il tendine:**
- a) Del gran rotondo
 - b) Del sovraspinoso
 - c) Del sottoscapolare
 - d) Del deltoide
13. **La decussazione delle piramidi avviene a livello di:**
- a) bulbo
 - b) ponte
 - c) mesencefalo
 - d) midollo spinale

14. **Nel sistema nervoso centrale i ventricoli sono:**
- a) tonache interposte tra la superficie del nevrasso e l'osso
 - b) cavità intercomunicanti scavate nel nevrasso
 - c) membrane che dividono la cavità cranica in camere
 - d) porzioni del cervelletto
15. **La funzione assolta dal liquido cefalorachidiano è:**
- a) protettiva del nevrasso
 - b) nutritizia del nevrasso
 - c) di drenaggio dei prodotti del metabolismo encefalico
 - d) tutte le alternative proposte sono corrette
16. **Quale tra le seguenti affermazioni sulla barriera emato-encefalica è falsa:**
- a) è un elemento protettivo dell'encefalo nei confronti delle infezioni
 - b) può essere danneggiata da agenti microbici
 - c) si oppone alla penetrazione di tutti i virus
 - d) limita la diffusione degli agenti terapeutici somministrati per via generale
17. **Il tremore intenzionale è un segno caratteristico di una lesione a carico:**
- a) dei fasci piramidali
 - b) della sostanza nera
 - c) del cervelletto
 - d) della corteccia cerebrale
18. **L'eccitabilità dei singoli assoni è:**
- a) direttamente proporzionale al loro diametro
 - b) inversamente proporzionale al loro diametro
 - c) indipendente dal diametro
 - d) direttamente proporzionale all'intensità dello stimolo
19. **La valvola tricuspide è:**
- a) Posta fra atrio sinistro e ventricolo sinistro
 - b) Detta anche valvola mitralica
 - c) Posta fra il ventricolo sinistro e l'aorta
 - d) Posta fra l'atrio destro e ventricolo destro
20. **Quale fra i seguenti non è un meccanismo fisiologico di difesa delle vie aeree?**
- a) La clearance muco-ciliare
 - b) Il riflesso della tosse
 - c) Il surfattante alveolare
 - d) Il broncospasmo

- 21 **La ventilazione totale al minuto in un soggetto sano è pari a circa:**
- a) 3000 ml/minuto
 - b) 5000 ml/minuto
 - c) 7500 ml/minuto
 - d) 10000 ml/minuto
- 22 **Il flusso d'aria delle piccolissime vie aeree è:**
- a) Laminare
 - b) Turbolento
 - c) Transizionale
 - d) Nullo
- 23 **L'ipotensione ortostatica si manifesta tipicamente:**
- a) in posizione seduta
 - b) durante la deambulazione
 - c) nel passaggio dal decubito alla stazione eretta
 - d) nel passaggio dalla stazione eretta al decubito
- 24 **La mobilizzazione precoce di un paziente post-infartuato deve essere momentaneamente sospesa qualora si verifichi:**
- a) un calo pressorio anche lieve nel passaggio dalla posizione supina a quella seduta
 - b) un incremento della frequenza cardiaca fino a 10 battiti dopo l'esercizio
 - c) un incremento della frequenza cardiaca superiore a 20 battiti dopo l'esercizio
 - d) aritmie, anche in assenza di sintomi emodinamici e disturbi soggettivi del paziente
- 25 **I neurinomi si localizzano:**
- a) esclusivamente nei nervi cranici
 - b) esclusivamente nei nervi radicolari del midollo spinale
 - c) esclusivamente nei nervi periferici
 - d) in tutte queste sedi
- 26 **La più frequente via di diffusione del carcinoma ovarico è:**
- a) intraperitoneale
 - b) retroperitoneale
 - c) linfatica
 - d) ematica
- 27 **L'indice di marcatura nei tumori è:**
- a) la percentuale di cellule proliferanti
 - b) la percentuale di cellule che incorporano i precursori degli acidi nucleici
 - c) il numero di cellule in mitosi diviso il numero di cellule contate
 - d) il numero di granuli radioattivi contati per cellula
- 28 **La "sindrome di Pancoast" è più frequentemente associata a:**
- a) carcinoma del polmone
 - b) carcinoma dello stomaco
 - c) carcinoma della mammella
 - d) carcinoma del rene

29 **Quale tumore dell'apparato digerente ha la prognosi peggiore:**

- a) carcinoma dell'esofago
- b) carcinoma del colon
- c) carcinoma del piccolo intestino
- d) carcinoide dell'appendice

30 **Il tumore benigno più frequente della laringe è :**

- a) il papilloma
- b) il fibroma
- c) l'angioma
- d) il mixoma