


TEST FISIOTERAPIA

NERVI
CRANICI

14.5 LESIONI DEI NERVI CRANICI

1 Quale fra le seguenti figure rappresenta il caso di emianopsia bilaterale omonima?



2 Con il termine nevralgia si deve intendere:

- A la sofferenza di un nervo periferico
- B il dolore avvertito nel territorio di un nervo sensitivo o misto
- C l'insieme di segni clinici quali dolore, ipoestesia e ipotrofia muscolare
- D l'aumento di sensibilità dovuta alla lesione di un nervo cranico

3 Quale fra le seguenti forme di nevralgia è la più frequente?

- A Nevralgia del glosso-faringeo
- B Nevralgia del grande auricolare
- C Nevralgia del grande occipitale
- D Nevralgia del trigemino

4 Quale delle seguenti condizioni può derivare da una patologia del nervo olfattivo?

- A Iposmia
- B Anosmia
- C Iperosmia
- D Tutte le alternative proposte sono corrette

5 La paralisi di un muscolo oculo-motore si può manifestare clinicamente con:

- A strabismo
- B diplopia
- C torcicollo oculare
- D tutte le alternative proposte sono corrette

- 6 **Il trisma si può manifestare in caso di lesione del nervo:**
- A facciale
 - B trigemino
 - C glosso-faringeo
 - D ipoglosso
- 7 **Quale fra i seguenti segni non è specifico di una lesione del nervo facciale?**
- A Spianamento delle rughe della fronte
 - B Iperacusia
 - C Difficoltà di deglutizione
 - D Lagoftalmo
- 8 **Che cosa comporta una lesione del nervo ipoglosso?**
- A Disfagia
 - B Difficoltà alla masticazione
 - C Emiparesi linguale
 - D Ageusia del terzo posteriore della lingua
- 9 **La disfagia per i cibi solidi è caratteristica in caso di lesione del nervo:**
- A glosso-faringeo
 - B vago
 - C accessorio del vago
 - D ipoglosso
- 10 **Quali delle seguenti condizioni possono derivare da una patologia del II nervo cranico?**
- A Retinite
 - B Emianopsia
 - C Nistagmo
 - D Ptosi palpebrale

14.7 POLINEUROPATIE, MALATTIE NEUROMUSCOLARI E MIOPATIE

- 1 **La sindrome di Guillain-Barré è una polineuropatia di origine:**
A infiammatoria autoimmune
B dismetabolica
C ereditaria secondo le leggi di Mendel
D alcolica
- 2 **Il diabete può essere causa di polineuropatia in quanto:**
A determina macroangiopatie
B determina microangiopatie
C determina alterazioni ormonali
D comporta l'uso protratto di farmaci
- 3 **Quale fra le seguenti non è una causa di polineuropatia di tipo carenziale-nutrizionale?**
A Carenza di vitamine B1-B2
B Malassorbimento
C Alcolismo cronico
D Diabete mellito
- 4 **Quale fra le seguenti malattie non è generalmente associata a polineuropatia di origine immunitaria?**
A Artrite reumatoide
B LES (lupus eritematosus sistemico)
C Diabete mellito
D Panartrite nodosa
- 5 **La malattia di Charcot-Marie-Tooth è una polineuropatia geneticamente determinata di tipo:**
A motorio (HNM)
B sensitivo (HSN)
C misto (HSMN)
D neurovegetativo (NV)
- 6 **Quale fra le seguenti sostanze può dare origine a una polineuropatia?**
A Piombo
B Arsenico
C Collanti sintetici
D Tutte le sostanze citate possono causare una polineuropatia
- 7 **Quale fra le seguenti miopatie non è di tipo ereditario?**
A Distrofia muscolare
B Distrofia miotonica
C Miopatia congenita
D Dermatomiosite

- 8 **Per la diagnosi di quale malattia viene utilizzata la manovra di Gower?**
- A Polimiosite
 - B Distrofia muscolare di Duchenne
 - C Polineuropatia diabetica
 - D Sindrome di Guillain-Barré
- 9 **Quale fra le seguenti malattie presenta solitamente la miglior prognosi?**
- A Distrofia muscolare di Duchenne
 - B Distrofia muscolare di Becker
 - C Distrofia miotonica di Steinert
 - D Sindrome di Guillain-Barré, in fase post-acute
- 10 **La causa primaria di exitus per distrofia muscolare di Duchenne è connessa a:**
- A infezioni
 - B atrofia muscolare
 - C insufficienza respiratoria
 - D interessamento del sistema nervoso
- 11 **L'atrofia muscolare spinale è caratterizzata da:**
- A ereditarietà
 - B interessamento muscolare simmetrico prossimo-distale
 - C compromissioni respiratorie e fagiche
 - D tutte le alternative proposte sono corrette
- 12 **Dopo quanti anni dalla forma acuta si manifesta generalmente la sindrome post-poliomielitica?**
- A Circa 10 anni
 - B Circa 15 anni
 - C Circa 20 anni
 - D Circa 30 anni.
- 13 **Quando si manifesta la distrofia muscolare?**
- A Nella prima infanzia
 - B Nel periodo compreso fra infanzia e adolescenza
 - C In età giovanile
 - D In età adulta
- 14 **Quali fra i seguenti sintomi si possono riscontrare nei disordini di tipo neuro-muscolare?**
- A Ipo/atrofia
 - B Ipo/areflessia
 - C Ipertonia
 - D Fascicolazioni muscolari
- 15 **Nelle malattie neuromuscolari infantili di origine genetica e in particolare nelle forme rapidamente progressive (distrofinopatie e atrofie muscolari spinali) quali trattamenti fisioterapici sono indicati?**
- A Mobilizzazioni passive e stiramenti muscolari
 - B Docce notturne
 - C Posture
 - D Tutte le alternative proposte sono corrette